


# MAPA DE CAPACIDADE DE USO DAS TERRAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PIAUÍ

POR: ADOLFO MARTINS DE MORAES

APÊNDICE DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  
TERESINA, FEVEREIRO DE 2004



## LEGENDA DAS CLASSES DE CAPACIDADE DE USO DAS TERRAS

II - LA1 - 2 - 3/2 - 1/1 al, di, La B - 17	Terras produtivas, profundas, planas ou suavemente onduladas, de textura média a argilosa, sem pedregosidade aparente; permeabilidade rápida na superfície e mais lenta em subsuperfície; ligeira limitação pela presença de alumínio trocável, baixa saturação de bases e baixa capacidade de troca; erosão laminar ligeira e sulcos superficiais ocasionais; cultivadas com lavouras anuais e pomares.
II - LA2 - 2 - 3 - 1/1 al, di, La B - 17	Terras produtivas, profundas, planas ou suavemente onduladas, de textura média, sem pedregosidade aparente; permeabilidade rápida na superfície e mais lenta em subsuperfície; ligeira limitação pela presença de alumínio trocável, baixa saturação de bases e baixa capacidade de troca; erosão laminar ligeira e sulcos superficiais ocasionais; cultivadas com lavouras anuais e pomares.
II - LA13 - 2 - 3 - 1/1 al, di, La B - 17	
II - LA3 - 2 - 3 - 1/2 al, di, La A - 17	Terras produtivas, profundas, planas, de textura média, sem pedregosidade aparente; permeabilidade rápida na superfície e mais lenta em subsuperfície; ligeira limitação pela presença de alumínio trocável, baixa saturação de bases e baixa capacidade de troca; erosão laminar ligeira e sulcos superficiais ocasionais; cultivadas com lavouras e pomares.
II - LA4 - 2 - 3 - 1/2 al, di, La B - 17	Terras produtivas, profundas, planas ou suavemente onduladas, de textura média, sem pedregosidade aparente; permeabilidade rápida na superfície e mais lenta em subsuperfície; ligeira limitação pela presença de alumínio trocável, baixa saturação de bases e baixa capacidade de troca; erosão laminar ligeira e sulcos superficiais ocasionais; cultivadas com lavouras e pomares.
II - LA5 - 2 - 3 - 1/1 al, di, La A - 17	Terras produtivas, profundas a moderadamente profundas, planas, de textura média, sem pedregosidade aparente; permeabilidade rápida na superfície e em subsuperfície; ligeira limitação pela presença de alumínio trocável, baixa saturação de bases e baixa capacidade de troca; erosão laminar ligeira e sulcos superficiais ocasionais; cultivadas com lavouras anuais e pomares.
II - LA6 - 2 - 5/3 - 1/1 al, di, La A - 1	Terras produtivas, profundas a moderadamente profundas, planas, de textura arenosa sobre média, sem pedregosidade aparente; boa permeabilidade na superfície e em subsuperfície; erosão não aparente; cultivadas com lavouras anuais.
II - NEO1 - 2 - 3 - 1/1 al, di, La A - 17	Terras produtivas, profundas a moderadamente profundas, planas, de textura média, sem pedregosidade aparente; permeabilidade rápida na superfície e em subsuperfície; erosão laminar ligeira; inundações ocasionais e curtas; cultivadas com lavouras anuais.
IV - ARG1 - 2 - 3 - 1/2 al, di, pns/sg La E - 37	
IV - ARG2 - 2 - 3 - 1/2 al, di, pns/sg La E - 37	Terras passíveis de serem utilizadas com culturas perenes ou pastagens ou reflorestamento e, ocasionalmente, com culturas anuais, apresenta do sérios problemas de conservação; relevo ondulado e forte ondulado; baixos níveis de fertilidade natural, alcos e destróicos; erosão laminar severa e sulcos superficiais ocasionais; são eventualmente cultivados com lavouras anuais.
IV - ARG3 - 2 - 3 - 1/2 al, di, pns/sg La E - 37	
VI - ARG4 - 2 - 3 - 1/2 al, di, pns/sg E - 37	
VI - ARG5 - 2 - 3 - 1/2 pd2, al, di, pns/sg E - 37	Terras impróprias para culturas anuais, mas que podem ser usadas para produção de certos cultivos permanentes úteis, como pastagens, florestas e algumas culturas permanentes protetoras do solo, desde que adequadamente manejadas.
VI - CHERNO2 - 2 - 2 - 1/2 ve, pns/sg E - 37	O uso com pastagens ou culturas permanentes protetoras deve ser feito com restrições moderadas, com práticas especiais de conservação. Apresenta sérios problemas de conservação, principalmente em função do relevo ondulado e forte ondulado; apresenta baixos níveis de fertilidade natural (álcos e destróicos); todavia, os solos podem apresentar bons padrões de fertilidade, mas também relevo muito desfavorável, erosão laminar severa e sulcos superficiais ocasionais; são eventualmente cultivados com lavouras anuais.
VI - CHERNO2.2 - 2 - 2 - 1/2 ve, pns/sg E - 37	
VI - NEO1 - 4 - 3 - 1/2 pd <sub>2</sub> pns/sg E - 37	
VI - NEO2 - 4 - 3 - 1/2 pd <sub>2</sub> pns/sg E - 37	
VI - NEO3 - 4 - 3 - 1/2 pd <sub>2</sub> pns/sg E - 37	

Área Edificada

Rio Perene

